

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

**ViSUSTRIN®****1mg/ml collirio, soluzione**

Tetrizolina cloridrato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è VISUSTRIN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare VISUSTRIN
3. Come usare VISUSTRIN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare VISUSTRIN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è VISUSTRIN e a cosa serve**

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

VISUSTRIN è un collirio contenente il principio attivo tetrizolina, che agisce decongestionando le mucose degli occhi, ovvero ne riduce l'infiammazione e il gonfiore.

VISUSTRIN si usa in caso di arrossamento, prurito, bruciore, gonfiore della congiuntiva.

**2. Cosa deve sapere prima di usare VISUSTRIN****Non usi VISUSTRIN:**

- Se è allergico alla tetrizolina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se è affetto da glaucoma o da altre gravi malattie dell'occhio.
- Nei bambini al di sotto dei 3 anni di età.

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare VISUSTRIN.

Se non ottiene sollievo entro le 48 ore dall'inizio del trattamento, sospenda l'uso e si rivolga al medico.

Prenda questo medicinale seguendo attentamente le indicazioni del foglio illustrativo o come indicato dal medico.

Se dopo 48 ore di trattamento i sintomi persistono sospenda l'uso e consulti il medico; in ogni caso, questo medicinale non deve essere impiegato per più di quattro giorni consecutivi, poiché possono verificarsi effetti indesiderati.

Si rivolga al medico in caso di infezioni, pus, corpi estranei nell'occhio, danni meccanici, chimici e da calore.

Il medicinale, pur presentando uno scarso assorbimento generale, deve essere usato con cautela se è affetto da pressione sanguigna alta, problemi alla tiroide, disturbi cardiaci e iperglicemia (diabete) e se è in trattamento con farmaci antidepressivi.

Può causare irritazione agli occhi.

**Per chi svolge attività sportive: attenzione, il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa per indicazione, schema posologico e via di somministrazione rispetto a quelle riportate in questo foglio informativo.**

**Bambini:**

SOLO PER ADULTI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state accertate. L'uso nei bambini al di sopra dei tre anni di età richiede l'approvazione del medico (vedere "Non usi VISUSTRIN").

**Altri medicinali e VISUSTRIN**

Non sono note interazioni tra Visustrin e altri farmaci.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

**Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale. In gravidanza e durante l'allattamento usi Visustrin solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

### **Visustrin contiene benzalconio cloruro**

Può causare irritazione agli occhi. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

### **3. Come usare VISUSTRIN**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 gocce in ogni occhio due o tre volte al giorno.

(Vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni").

Attenzione non superi le dosi raccomandate senza il consiglio del medico.

Non usi per più di quattro giorni.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Uso nei bambini:**

SOLO PER ADULTI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state accertate. Non utilizzare al di sotto dei 3 anni (vedere sezione "Controindicazioni").

L'uso nei bambini al di sopra dei tre anni di età richiede l'approvazione del medico.

### **Se usa più VISUSTRIN di quanto deve**

Il prodotto se viene ingerito accidentalmente o se impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive può determinare fenomeni tossici.

In caso di sovradosaggio, sospenda il trattamento e avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Con l'uso di questo medicinale sono stati riportati: dilatazione delle pupille, effetti di assorbimento generali (pressione sanguigna alta, disturbi cardiaci, iperglicemia ovvero aumento del tasso di zuccheri nel sangue), aumento della pressione all'interno dell'occhio, nausea, mal di testa.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

### **Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini**

Tenere lontano dalla portata dei bambini poiché l'ingestione accidentale può provocare sedazione spiccata.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare VISUSTRIN**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene VISUSTRIN**

- Il principio attivo è la tetrizolina cloridrato. 10 ml di collirio contengono 10 mg di tetrizolina cloridrato.
- Gli altri componenti sono: Acido bórico; sodio cloruro; borace; benzalconio cloruro; sodio edetato; acqua depurata.

#### **Descrizione dell'aspetto di VISUSTRIN e contenuto della confezione**

VISUSTRIN si presenta in forma di collirio, soluzione.

Un flacone da 10 ml.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Pietrasanta Pharma S.p.A.

Via di Caprino, 7 55012 Capannori - Lucca

### **Produttore**

Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva 8- 56121 Pisa

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 01/01/2018**

