

## FOGLIO ILLUSTRATIVO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>NOME SPECIALITA':</b>  | <b>USTIOSAN</b>             |
| <b>CODICE ATC:</b>        | <b>D08AH03 oxichinolina</b> |
| <b>CODICE AIC:</b>        | <b>021247</b>               |
| <b>CODICE CONFEZIONE:</b> | <b>085</b>                  |

# USTIOSAN “crema” tubo 30g

**Ferite superficiali, escoriazioni, punture di insetti, eritemi solari, ustioni minori**

**Legga attentamente questo foglio poiché contiene importanti informazioni per lei.**

Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione medica. Tuttavia, deve usarlo in modo accurato per ottenerne i migliori risultati.

Conservi questo foglio, potrebbe aver bisogno di leggerlo nuovamente.

Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.

Se i suoi sintomi peggiorano o non migliorano dopo un breve periodo di trattamento, deve contattare il medico.

### In questo foglio:

1. Cos'è USTIOSAN e a cosa serve
2. Prima di usare USTIOSAN
3. Come usare USTIOSAN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare USTIOSAN
6. Altre informazioni

### 1. COS'È USTIOSAN E A COSA SERVE

#### Categoria farmacoterapeutica

USTIOSAN è un anestetico di superficie ed antisettico.

#### Indicazioni terapeutiche

Lesioni cutanee quali ferite superficiali, escoriazioni, punture d'insetti.

Ustioni minori, eritemi solari.

Irritazioni cutanee da vari agenti chimico-fisici.

## 2. PRIMA DI USARE USTIOSAN

### **Non usare USTIOSAN in caso di:**

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

### **Gravidanza e allattamento**

Usare solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico.

### **Uso pediatrico e negli anziani**

Nei bambini e negli anziani utilizzare solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo medico.

### **Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso**

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso sospendere il trattamento e consultare il medico per istituire, se necessario, una terapia idonea. Utilizzare su lesioni non estese e per brevi periodi di tempo. Evitare l'applicazione del medicamento in prossimità delle congiuntive oculari.

### **Interazione con altri medicinali, alimenti e altre forme di interazione**

In generale è da evitare l'impiego contemporaneo di antisettici nella stessa sede. Chiedere consiglio al vostro medico o farmacista se state usando altri medicinali, compresi quelli senza prescrizione medica.

### **Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari**

Nessuno.

## 3. COME USARE USTIOSAN

### **Quanto e come**

Crema per uso esterno. Applicare in strato uniforme 1-2 cm di crema sulla parte lesa; sovrapporvi, se necessario, una medicazione protettiva con garza sterile e cerotto adesivo.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

### **Quando e per quanto tempo:**

Ripetere l'applicazione 1-2 volte al giorno

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico, così come se insorge irritazione o persistono arrossamento, gonfiore o dolore. Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche. Rivolgersi al medico o al farmacista per qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale.

### **Se si usa una dose eccessiva di USTIOSAN**

L'ingestione accidentale di quantità significative di prodotto provoca sintomi quali diarrea, vertigine, cianosi. L'antidoto utilizzato in questi casi è il blu di metilene che va somministrato presso un pronto soccorso.

In tal caso avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

### **Condotta da seguire se ci dimenticadi usare USTIOSAN**

Nessuna. Non prendere una dose extra rispetto alle modalità d'uso indicate.

#### 4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, USTIOSAN può causare effetti indesiderati, il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

#### 5. COME CONSERVARE USTIOSAN Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

**Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

#### 6. ALTRE INFORMAZIONI

**Composizione:** 100 g contengono:

**Sostanze attive:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Procaina cloridato</b>      | mg 500 pari a mg 433 di Procaina        |
| <b>Lidocaina cloridrato</b>    | mg 500 pari a mg 406 di Lidocaina       |
| <b>8-ossichinolina solfato</b> | mg 270 pari a mg 193 di 8-ossichinolina |

**Eccipienti:**

Acidi grassi poliglicolici (PEG-8 C 12-18 alchilestere), Gliceril stearato, Lanolina idrogenata, Olio avocado, Glicerina, Butilidrossianisolo, Acqua distillata di Hamamelis Virginiana.

**Forma farmaceutica e contenuto**

“crema” tubo da 30 g

**Titolare autorizzazione all'immissione in commercio**

Kelémata S.r.l. C.so Re Umberto n.20 – 10128 Torino A.I.C 021247085

**Produttore e controllore finale**

Kelémata S.r.l. officina di Martellago (Ve) via Castellana, 120

Data ultima revisione da parte dell'AIFA: Giugno 2010.