

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

### **MOBILISIN 40 g Crema**

Acido Flufenamico + Etilenglicole monosalicilato + Glicosaminoglicanopolisolfato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è MOBILISIN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MOBILISIN
3. Come usare MOBILISIN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MOBILISIN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è MOBILISIN e a cosa serve**

MOBILISIN appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), usati per alleviare il dolore e l'infiammazione.

MOBILISIN è usato negli adulti per trattare localmente il dolore e l'infiammazione dei muscoli, dei tendini, dei legamenti e delle articolazioni.

Inoltre è indicato per trattare tensione muscolare, mal di schiena, rigidità cervicale, nevralgie, sciatica.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare MOBILISIN**

##### **Non usi MOBILISIN**

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

- Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MOBILISIN se soffre di insufficienza renale.
- Eviti l'esposizione alla luce del sole delle zone trattate con la crema.
- NON USI la crema su bruciature, infezioni o altre malattie della pelle.
- L'uso cronico può provocare reazioni cutanee. Interrompa immediatamente il trattamento e consulti il medico se si verifica una reazione allergica dopo l'applicazione della crema.
- Se il medicinale è usato su aree cutanee estese e per un periodo prolungato, non si può escludere la possibilità di effetti indesiderati di tipo sistemico (che possono cioè interessare diverse parti dell'organismo) (vedere paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati").

### **Bambini**

Non sono disponibili dati sull'efficacia e la sicurezza in questa popolazione. Pertanto, non usi MOBILISIN nei bambini.

### **Altri medicinali e MOBILISIN**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- metotrexato (medicinale usato per trattare alcuni tipi di cancro)
- sulfaniluree (ad es. glimepiride, gliclazide, medicinali usati per trattare il diabete).

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Durante la gravidanza e l'allattamento potrà usare questo medicinale solo se ritenuto strettamente necessario dal medico, sotto il suo diretto controllo, e solo per un breve periodo di trattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Nessun effetto noto.

### **MOBILISIN contiene acido sorbico**

L'**acido sorbico** può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

## **3. Come usare MOBILISIN**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è un filo di crema di 5-10 cm, a seconda dell'ampiezza della zona da trattare, più volte al giorno.

Se necessario, dopo aver consultato il medico, è possibile usare MOBILISIN anche per periodi di tempo prolungati.

#### **Modo d'uso:**

- Massaggiare leggermente per favorire l'assorbimento.
- Dopo l'applicazione, lavarsi le mani, altrimenti risulteranno anch'esse trattate con la crema.
- Non mettere in contatto con occhi o membrane mucose.
- Non ingerire.

#### **Se usa più MOBILISIN di quanto deve**

In caso di assunzione di una dose eccessiva di MOBILISIN, lavi accuratamente la zona trattata con acqua corrente e contatti immediatamente il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se il medicinale è usato su aree cutanee estese e per un periodo prolungato, non si può escludere la possibilità di effetti indesiderati di tipo sistemico (che possono interessare diverse parti dell'organismo) come disturbi gastrointestinali, nausea, mal di testa, capogiri e malessere generale; se nota uno di questi sintomi interrompa il trattamento e consulti il medico.

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 su 1000 persone):

- irritazione cutanea o eritema
- prurito
- eruzioni cutanee
- aumentata sensibilità della pelle alla luce del sole

Solitamente questi sintomi scompaiono con la sospensione del trattamento.

**Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.**

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare MOBILISIN**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene MOBILISIN**

- I principi attivi sono acido flufenamico, etilenglicole monosalicilato, glicosaminoglicanopolisolfato. 100 g di crema contengono 3,0 g di acido flufenamico, 2,64 g di etilenglicole monosalicilato e 0,20 g di glicosaminoglicanopolisolfato
- Gli altri componenti sono mono-di-gliceridi di acidi grassi, sali di sodio di alcool grassi solfonati, trigliceridi di acidi grassi vegetali, alcool miristico, silicato di alluminio e magnesio, acido cloridrico 25%, acido sorbico, isopropanolo, olio di rosmarino, olio di melissa, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di MOBILISIN e contenuto della confezione**

Crema cutanea per uso esterno.

MOBILISIN è disponibile in confezioni contenenti 40 g di crema in tubo di alluminio.

**Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

CRINOS S.p.A., Via Pavia, 6 – 20136 Milano

**Produttore**

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse, 1 - 85276 - Pfaffenhofen (Germania)

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel (Germania)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 15 Luglio 2014**