

Foglio illustrativo, informazioni per il paziente
LASTICOM 0,5 mg/ml collirio, soluzione
Azelastina cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 2 giorni. Il sollievo dei sintomi da congiuntivite allergica si nota dopo 15-30 minuti.
- In questo foglio illustrativo Lasticom 0,5 mg/ml collirio, soluzione è chiamata Lasticom.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lasticom e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lasticom
3. Come usare Lasticom
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lasticom
6. Contenuto della confezione e altre informazioni.

1. Che cos'è Lasticom e a che cosa serve

Lasticom contiene il principio attivo azelastina cloridrato, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antiallergici (antistaminici). Gli antistaminici agiscono prevenendo gli effetti di sostanze come l'istamina, che il corpo produce in seguito a una reazione allergica. È stato dimostrato che Lasticom riduce l'infiammazione oculare.

Lasticom può essere usato per il trattamento e la prevenzione di disturbi oculari causati da febbre da fieno (congiuntivite allergica stagionale), in adulti e bambini dai 4 anni di età in poi.

Lasticom può essere usato per i disturbi oculari causati da un'allergia a sostanze come gli acari della polvere o il pelo degli animali (congiuntivite allergica perenne), in adulti e bambini dai 12 anni di età in poi.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 2 giorni.

Lasticom non è indicato nel trattamento delle infezioni oculari.

2. Cosa deve sapere prima di usare Lasticom

Non usi Lasticom:

- se è allergico ad azelastina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lasticom:

- se non è sicuro che i suoi disturbi oculari siano causati da un'allergia. In particolare, se è interessato solo un occhio; se la sua vista è indebolita; o se l'occhio le brucia ma non ha alcun sintomo al naso, è possibile che abbia un'infezione invece che un'allergia;
- se i disturbi peggiorano o durano più di 48 ore senza un miglioramento apprezzabile nonostante l'uso di Lasticom;
- se è portatore di lenti a contatto.

Bambini e adolescenti

Per il trattamento di disturbi oculari causati da febbre da fieno (congiuntivite allergica stagionale): non somministrare questo medicinale a bambini di età inferiore a 4 anni, perché non ne sono state dimostrate la sicurezza e l'efficacia.

Per il trattamento di disturbi oculari causati da un'allergia (congiuntivite allergica non stagionale (perenne)): non somministrare questo medicinale a bambini di età inferiore a 12 anni, perché non ne sono state dimostrate la sicurezza e l'efficacia.

Altri medicinali e Lasticom

Sebbene non siano note interazioni da parte di altri medicinali con Lasticom, informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Quando utilizza Lasticom può avvertire un offuscamento transitorio della vista. Se ciò accade, non deve guidare o utilizzare macchinari fino a quando la visione non è di nuovo chiara.

Lasticom contiene benزالconio cloruro

Questo medicinale contiene 0,00375 mg di benزالconio cloruro in ciascuna goccia, che equivale a 0,00375 mg/0,03 ml.

Il benزالconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può alterare il loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.

Il benزالconio cloruro può causare irritazione agli occhi, in particolar modo se ha l'occhio secco o alterazioni della cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, fitte dolorose dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.

3. Come usare Lasticom

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Ricordi:

- Lasticom deve essere applicato solo negli occhi.

La dose raccomandata è:

Disturbi oculari causati da febbre da fieno (congiuntivite allergica stagionale)

- Impiego in adulti e bambini dai 4 anni di età in poi
- La dose abituale è una goccia in ogni occhio la mattina e la sera.

Se prevede di entrare in contatto con il polline, può assumere la dose abituale di Lasticom come misura preventiva prima di uscire all'aperto.

Disturbi oculari causati da un'allergia (congiuntivite allergica non stagionale (perenne))


- Impiego in adulti e bambini dai 12 anni di età in poi
- La dose abituale è una goccia in ogni occhio la mattina e la sera.

Se i suoi sintomi sono gravi, il suo medico può aumentarle la dose di una goccia in ogni occhio, fino a quattro volte al giorno. Il sollievo dei sintomi da congiuntivite allergica dovrebbe avvenire dopo 15-30 minuti.

Applicazione di Lasticom collirio

Per aiutarla ad applicare in modo corretto il collirio, può esserle utile sedere davanti a uno specchio, in modo che per le prime volte possa vedere cosa sta facendo.

1. Si lavi le mani.
2. Pulisca delicatamente l'area intorno agli occhi con un fazzoletto, per rimuovere l'umidità (Figura 1).
3. Sviti il tappo del flacone e controlli che il contagocce sia pulito.
4. Abbassi delicatamente con un dito la palpebra inferiore dell'occhio da trattare (Figura 2).
5. Inserisca accuratamente la goccia nell'occhio, al centro della palpebra inferiore (Figura 3). Faccia attenzione a non toccare l'occhio con il contagocce.
6. Rilasci la palpebra inferiore e prema delicatamente sull'angolo interno dell'occhio contro il dorso del naso (Figura 4). Tenendo il dito premuto contro il naso, batta le palpebre un paio di volte, affinché la goccia si distribuisca su tutta la superficie dell'occhio.
7. Asciughi il medicinale in eccesso con un fazzoletto.
8. Ripeta lo stesso procedimento per l'altro occhio.



Durata del trattamento

Se possibile, deve usare Lasticom regolarmente fino alla scomparsa dei sintomi.

- Non usi Lasticom per più di 6 settimane

Se usa più Lasticom di quanto deve

Se ha applicato una dose eccessiva di Lasticom, è improbabile che abbia problemi. Se è preoccupato, contatti il suo medico. In caso di ingestione accidentale di Lasticom, contatti immediatamente il suo medico o il più vicino pronto soccorso ospedaliero.

Se dimentica di usare Lasticom

Usi il collirio non appena se ne ricorda, quindi assuma la dose successiva come di consueto. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Lasticom

Se interrompe l'uso di Lasticom i sintomi potrebbero ripresentarsi.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati. Sebbene non tutte le persone li manifestino.

Questi effetti comprendono:

- *Comuni (può interessare fino a 1 persona su 10):* leggera irritazione (bruciore, prurito, lacrimazione) agli occhi dopo l'applicazione di Lasticom. Non dovrebbe durare a lungo;
- *Non comuni (può interessare fino a 1 persona su 100):* sapore amaro in bocca. Dovrebbe sparire velocemente soprattutto se sorseggia una bevanda analcolica;
- *Molto rari (può interessare fino a 1 persona su 10.000):* reazione allergica (come eruzione cutanea e prurito).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

5. Come conservare Lasticom

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta del flacone e sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Una volta aperto: non usi questo medicinale se il flacone è aperto da oltre 4 settimane.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lasticom

Il principio attivo è azelastina cloridrato 0,05% (0,5 mg/ml). Ogni goccia contiene 0,015 mg di azelastina cloridrato.

Gli altri eccipienti sono benzalconio cloruro, edetato disodico, ipromellosa, sorbitolo liquido (cristallizzato (E420i)), idrossido di sodio (E524) e acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di Lasticom e contenuto della confezione

Lasticom è una soluzione chiara e inodore.

Lasticom è fornito in un flacone di plastica con un contagocce. Un flacone contiene 6, 8 o 10 ml di collirio, soluzione. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Cooper Consumer Health B.V.

Verrijn Stuartweg 60 – 1112 AX Diemen

(Paesi Bassi)

Produttore

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica 20/22

00071 Pomezia (Roma)

Italia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo e Regno Unito (Irlanda del Nord) con le seguenti denominazioni:

| | |
|--|-----------------------------------|
| <i>Austria:</i> | Allergodrop |
| <i>Germania</i> | Allergodil akut Augentropfen |
| <i>Irlanda:</i> | Azelastine Eye Drops |
| <i>Italia</i> | Lasticom |
| <i>Paesi Bassi:</i> | Carelastin azelastine oogdruppels |
| <i>Regno Unito (Irlanda del Nord):</i> | Azelastine |
| <i>Spagna:</i> | Corifina |
| <i>Svezia:</i> | Oculastin |

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Dicembre 2025