

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE**Lamisil 1% spray cutaneo, soluzione**
Terbinafina cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di iniziare ad usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al farmacista.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi entro una settimana dal completamento del trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Lamisil Spray e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lamisil Spray
3. Come usare Lamisil Spray
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lamisil Spray
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È LAMISIL SPRAY E A COSA SERVE

Lamisil Spray è un antifungino (antimicotico) da usare sulla pelle. Agisce uccidendo i funghi che causano problemi alla pelle.

Lamisil Spray è usato per curare:

- Tinea pedis (infezione micotica ai piedi o Piede d'atleta)
- Tinea cruris (infezione micotica alle pieghe inguinali)
- Tinea corporis (infezione micotica al tronco o tigna)
- Infezione della pelle provocata da un lievito chiamata pityriasis versicolor.

Se non è sicuro della causa della sua infezione, chiedi consiglio al tuo medico o al farmacista prima di usare Lamisil spray.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE LAMISIL SPRAY**Non usi Lamisil Spray**

- se è allergico alla terbinafina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6 e alla fine del paragrafo 2).

Se questo è il suo caso **informi il medico o il farmacista e non usi Lamisil Spray.**

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lamisil Spray.

- Lamisil Spray è esclusivamente per uso esterno
- Non utilizzare all'interno della bocca e non deglutire

- Evitare il contatto dello spray con il viso, con gli occhi o con la pelle danneggiata dove l'alcol può essere irritante. Se lo spray dovesse entrare accidentalmente a contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente con acqua corrente.
- Se dovesse persistere un qualsiasi fastidio, consulti il medico.
- Non inalare lo spray.
- Lamisil Spray contiene alcool. Tenere lontano da fiamme vive.

Bambini e adolescenti

I bambini e gli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non devono usare Lamisil Spray.

Altri medicinali e Lamisil Spray

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

- **Non applichi altri medicinali o trattamenti sull'area interessata** (compresi quelli senza prescrizione medica) contemporaneamente a Lamisil Spray.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale. Lamisil Soluzione non deve essere usato in gravidanza se non strettamente necessario.

Questo medicinale può passare nel latte materno. Se sta allattando al seno, chiedi consiglio al medico prima di usare questo medicinale. Non faccia entrare in contatto il neonato con nessuna delle aree trattate, compreso il seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

L'uso di Lamisil Spray non ha influenza sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Lamisil Spray contiene etanolo 96%

Questo medicinale contiene 250 mg/g di etanolo 96%.

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Lamisil Spray contiene propilene glicole

Questo medicinale contiene 50 mg/g di propilene glicole.

3. COME USARE LAMISIL SPRAY

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente come descritto in questo foglio o secondo le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è l'applicazione dello spray una o due volte al giorno per una settimana come indicato sotto.

Indicazioni per l'uso:

Solo adulti

- Pulire e asciugare la pelle interessata dall'infezione e l'area circostante, poi lavare le mani.
- Rimuovere il tappo dal flacone.
- Quando si usa lo spray per la prima volta, premere qualche volta la pompa fino alla comparsa di uno spruzzo pieno.
- Spruzzare un quantitativo di soluzione sufficiente a inumidire completamente la pelle interessata dall'infezione e l'area circostante. Si può tenere il flacone dritto in posizione verticale o capovolto per raggiungere più facilmente le aree interessate dall'infezione.
- Richiudere il flacone con il tappo.
- Lavare le mani dopo aver toccato la pelle infetta, per evitare di diffondere l'infezione a se stesso o ad altri.

Se sta trattando un'infezione nelle pieghe della pelle può coprire l'area trattata con una striscia di garza, specialmente di notte. In tal caso, utilizzi una striscia di garza fresca e pulita ogni volta che applica il prodotto.

Con quale frequenza e per quanto tempo deve usare Lamisil spray

Se non diversamente indicato dal medico, applichi lo spray una o due volte al giorno sulle aree interessate come descritto di seguito:

- **Tinea pedis (Piede d'atleta):** applicare una volta al giorno per una settimana
- **Tinea cruris e tinea corporis:** applicare una volta al giorno per una settimana
- **Pytirisias versicolor:** applicare due volte al giorno per una settimana

Usi il prodotto per il periodo di trattamento raccomandato anche se l'infezione sembra migliorare dopo pochi giorni. Le infezioni di solito sembrano migliorare dopo pochi giorni ma possono ricomparire se il prodotto non è applicato regolarmente o se è interrotto troppo presto.

Il prodotto dovrebbe iniziare a migliorare le condizioni della pelle entro pochi giorni.

Se non osserva alcun segno di miglioramento entro una settimana dal completamento del trattamento contatti un farmacista per verificare che il prodotto sia utilizzato correttamente o si rivolga a un medico per verificare la diagnosi.

Getti via lo spray rimasto dopo 12 settimane dalla prima apertura del flacone.

Come ottimizzare il trattamento

Tenga pulita l'area interessata dall'infezione lavandola regolarmente. L'asciughi perfettamente senza sfregare, ma tamponandola delicatamente. Sebbene l'area possa essere pruriginosa, cerchi di non grattarsi perché così facendo potrebbe causare un danno maggiore, e rallentare così il processo di guarigione o diffondere ulteriormente l'infezione.

Usi asciugamani e indumenti personali, non li condivida con altre persone in quanto queste infezioni possono trasmettersi facilmente. Li lavi frequentemente per proteggersi da reinfezioni.

Se dimentica di usare Lamisil Spray

Se dimentica una applicazione, applichi lo spray appena può e poi continui seguendo il solito schema di applicazioni. Tuttavia, se è quasi ora per l'applicazione successiva, applichi la solita quantità di spray e continui seguendo il normale schema di applicazioni. Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Usi lo spray seguendo le indicazioni. Questo è importante perché, saltando le applicazioni, l'infezione rischia di ritornare.

Se ingerisce accidentalmente Lamisil Spray

Informi immediatamente il medico che le consiglierà come procedere. Deve essere tenuto in considerazione il contenuto di alcool.

Se accidentalmente Lamisil Spray entra in contatto con gli occhi

Risciacqui gli occhi accuratamente con acqua corrente. Contatti il medico se il fastidio rimane.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Lamisil Spray, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Alcune persone possono essere allergiche a Lamisil Spray e questo può causare **gonfiore e dolore, rash cutaneo o orticaria**. Questi effetti sono stati riportati con frequenza *non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)*.

Interrompa l'uso della soluzione e chiedi immediatamente consiglio al medico se manifesta uno qualsiasi di questi particolari sintomi.

Sono stati riportati anche i seguenti effetti indesiderati:

Comuni (*possono interessare fino ad una persona su 10*)

Desquamazione della pelle e prurito al sito applicazione.

Non comuni (*possono interessare fino ad una persona su 100*)

Lesioni cutanee, croste, alterazioni cutanee, discromie della pelle, rossore, bruciore, dolore e irritazione nel sito di applicazione.

Rari (*possono interessare fino ad una persona su 1000*)

Secchezza cutanea, eczema, aggravamento delle condizioni, eczema da contatto (un tipo di infiammazione della pelle).

Se Lamisil Spray viene accidentalmente applicato sugli occhi, può causare irritazione.

Non nota (*la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili*)

Rash

Segnalazione di effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE LAMISIL SPRAY

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Non refrigerare o congelare.

Chiudere il flacone con il tappo dopo l'uso. Gettare lo spray rimasto dopo 12 settimane dalla prima apertura.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Lamisil Spray

- Il principio attivo è terbinafina cloridrato. 1 grammo di Lamisil Spray contiene 10 mg di terbinafina cloridrato (1% p/p).
- Gli eccipienti sono acqua depurata, etanolo 96%, propilene glicole (E1520), macrogol cetostearile etere.

Descrizione dell'aspetto di Lamisil Spray e contenuto della confezione

Lamisil spray cutaneo è un liquido limpido, da incolore a giallo pallido.

Lamisil 1% spray cutaneo, soluzione è disponibile in flaconi con pompa a spruzzo da 15 e 30 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Novartis Farma S.p.A.

Viale Luigi Sturzo 43

20154 Milano MI

Italia

Produttore

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

80058 Torre Annunziata NA

Italia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri della Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Austria: Lamisil 1% Spray, Lösung

Finlandia: Lamisil 1 % sumute iholle, liuos

Francia: LAMISIL 1%, SOLUTION POUR PULVÉRISATION CUTANÉE

Germania: Lamisil Spray

Grecia: LAMISIL 1% Δερματικό εκνέφωμα διάλυμα

Italia: Lamisil 1% spray cutaneo, soluzione

Portogallo: Lamisil, 10 mg/g, solução para pulverização cutânea

Svezia: Lamisil 1 % kutan spray, lösning

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 03/2024