

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

Connettivina Plus 2 mg + 40 mg garze impregnate
Connettivina Plus 4 mg + 80 mg garze impregnate
Connettivina Plus 12 mg + 240 mg garze impregnate
Acido ialuronico sale sodico + sulfadiazina argentrica

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Connettivina Plus e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Connettivina Plus
3. Come usare Connettivina Plus
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Connettivina Plus
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Connettivina Plus e a che cosa serve

Connettivina Plus garze impregnate contiene due principi attivi: acido ialuronico sale sodico e sulfadiazina argentrica, ed appartiene ad una classe di medicinali definiti cicatrizzanti e disinfettanti.

L'acido ialuronico è una sostanza naturalmente prodotta dal nostro organismo. L'apporto locale di acido ialuronico facilita il processo di cicatrizzazione delle lesioni.

La sulfadiazina argentrica è un principio attivo appartenente alla famiglia degli antibiotici sulfamidici, è in grado di bloccare i meccanismi di replicazione batterica e di contrastare, così, la formazione di infezioni.

Connettivina Plus garze impregnate è indicata per il trattamento locale di piaghe allo stadio iniziale (prima che la pelle si laceri) e per il trattamento di bruciature di grado lieve (ustioni di I e di II grado).

2. Cosa deve sapere prima di usare Connettivina Plus

Non usi Connettivina Plus:

se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Connettivina Plus se:

- ha avuto, dopo l'assunzione di sulfamidici, una reazione di ipersensibilità (reazione allergica);
- ha gravi problemi al fegato (insufficienza epatica);
- ha gravi problemi ai reni (insufficienza renale);
- se è in gravidanza o se sta allattando.

Altri medicinali e Connettivina Plus

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Ponga particolare attenzione quando usa Connettivina Plus insieme ad enzimi proteolitici ad uso locale, poiché la loro azione potrebbe essere impedita dai componenti presenti nelle garze.

Non usi contemporaneamente disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Connettivina Plus non deve essere usato in gravidanza o durante l'allattamento a meno che il medico non ritenga che i benefici terapeutici superino i possibili rischi. In tal caso Connettivina Plus deve essere usata solo sotto il diretto controllo del medico stesso.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Connettivina Plus non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Connettivina Plus garze impregnate contiene polietilenglicole 4000. Può causare irritazione cutanea.

3. Come usare Connettivina Plus

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi una o più garze di Connettivina Plus, a seconda dell'estensione della lesione da trattare, due o più volte al giorno.

Prima di applicare CONNETTIVINA PLUS, le zone interessate devono essere pulite preferibilmente con soluzione fisiologica sterile (NaCl 0,9%) e disinfettate mediante antisettici preferibilmente contenenti iodopovidone o clorexidina. Se il medico lo ritiene necessario, deve essere effettuata la pulizia chirurgica.

Nel trattamento delle ustioni la pulizia delle lesioni è preferibile venga effettuata con sola acqua o soluzione fisiologica sterile evitando la disinfezione con agenti antisettici prima dell'applicazione di Connettivina PLUS.

Non interrompa il trattamento fintanto che la lesione non sarà completamente cicatrizzata.

Consulti il medico se i sintomi persistono dopo un breve periodo di trattamento, o in qualsiasi momento, se peggiorano.

Se usa più Connettivina Plus di quanto deve

In caso di utilizzo accidentale di una dose eccessiva di Connettivina Plus, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono noti casi di sovradosaggio dovuti all'utilizzo di una quantità eccessiva di Connettivina Plus.

Se dimentica di usare Connettivina Plus

Se ha dimenticato di applicare la garza, lo faccia appena se ne ricorda. Quindi continui l'applicazione secondo lo schema usuale.

Se interrompe il trattamento con Connettivina Plus

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, anche questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Dopo l'applicazione di CONNETTIVINA PLUS garze, possono verificarsi reazioni locali (dolore, bruciore, prurito) anche di natura allergica.

A seguito dell'applicazione di Connettivina Plus su zone estese della pelle, lei potrebbe manifestare gli effetti indesiderati che solitamente si osservano con l'assunzione di medicinali a base di sulfamidici (classe di farmaci di cui fa parte la sulfadiazina) per via orale o iniettiva (vie sistemiche) quali:

- gravi problemi ai reni (insufficienza renale);
- infiammazione del fegato come reazione a determinate sostanze a cui si viene esposti (epatite tossica);
- riduzione del numero dei globuli bianchi (agranulocitosi e leucopenia) e di piastrine (trombocitopenia) circolanti nel sangue.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Connettivina Plus

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza indicata si riferisce al medicinale in confezionamento integro, correttamente conservato. Conservi a temperatura inferiore a 30°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Connettivina Plus

Connettivina Plus 2 mg + 40 mg garze impregnate

- I principi attivi sono acido ialuronico sale sodico e sulfadiazina argentica. Ogni garza è impregnata con 4 g di crema contenente 2 mg di acido ialuronico e 40 mg di sulfadiazina argentica.
- Gli altri componenti sono: polietilenglicole 4000, glicerolo, acqua depurata.

Connettivina Plus 4 mg + 80 mg garze impregnate

- I principi attivi sono acido ialuronico sale sodico e sulfadiazina argentica. Ogni garza è impregnata con 8 g di crema contenente 4 mg di acido ialuronico e 80 mg di sulfadiazina argentica.
- Gli altri componenti sono: polietilenglicole 4000, glicerolo, acqua depurata.

Connettivina Plus 12 mg + 240 mg garze impregnate

- I principi attivi sono acido ialuronico sale sodico e sulfadiazina argentica. Ogni garza è impregnata con 24 g di crema contenente 12 mg di acido ialuronico e 240 mg di sulfadiazina argentica.
- Gli altri componenti sono: polietilenglicole 4000, glicerolo, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Connettivina Plus e contenuto della confezione

Connettivina Plus 2 mg + 40 mg garze impregnate

Una confezione contiene 10 garze impregnate di cm 10x10, contenute in una busta singola sigillata di carta-alluminio-politene.

Connettivina Plus 4 mg + 80 mg garze impregnate

Una confezione contiene 10 garze impregnate di cm 10x20, contenute in una busta singola sigillata di carta-alluminio-politene.

Connettivina Plus 12 mg + 240 mg garze impregnate

Una confezione contiene 5 garze impregnate di cm 20x30, contenute in una busta singola sigillata di carta-alluminio-politene.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

35031 Abano Terme (PD)

Produttore

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

35031 Abano Terme (PD)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 03/2017