

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**  
**Vicks Tosse Fluidificante 200 mg/15 ml Sciroppo**  
guaifenesina

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Vicks Tosse Fluidificante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Vicks Tosse Fluidificante
3. Come prendere Vicks Tosse Fluidificante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Vicks Tosse Fluidificante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è Vicks Tosse Fluidificante e a cosa serve**

Vicks Tosse Fluidificante contiene il principio attivo *guaifenesina*, che appartiene al gruppo di medicinali chiamati espettoranti, in grado di fluidificare e facilitare l'espulsione delle secrezioni dell'apparato bronchiale. Vicks Tosse Fluidificante è indicato come fluidificante nelle condizioni acute e croniche dell'apparato bronchiale.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 7 giorni.

**2. Cosa deve sapere prima di prendere Vicks Tosse Fluidificante**

**Non prenda Vicks Tosse Fluidificante**

- Se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Vicks Tosse Fluidificante.

Faccia particolare attenzione e chiedi consiglio al medico prima di prendere Vicks Tosse Fluidificante se:

- ha una tosse cronica o persistente (per più di una settimana), come ad esempio quella che si presenta a causa di asma, fumo, bronchite cronica e una malattia ai polmoni chiamata enfisema o tosse con eccessivo muco per evitare l'automedicazione prolungata e mascherare i sintomi che richiedono un trattamento più complesso;
- deve sottoporsi ad esami di laboratorio per la determinazione dei livelli di acido 5-idrossiindol-acetico e vanilmandelico. Vicks Tosse Fluidificante può determinare un risultato falso positivo.

Si rivolga al medico se i sintomi persistono per più di 7 giorni o se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Bambini**

Vicks Tosse Fluidificante non é raccomandato nei bambini di età inferiore a 2 anni a meno che il medico non lo ritenga strettamente necessario.

### **Altri medicinali e Vicks Tosse Fluidificante**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare se la guaifenesina possa potenzialmente compromettere la fertilità.

#### Gravidanza

Prenda questo medicinale solo in caso di effettiva necessità e sotto il controllo del medico.

#### Allattamento

Prenda questo medicinale solo in caso di effettiva necessità e sotto il controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Vicks Tosse Fluidificante altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Vicks Tosse Fluidificante contiene:**

- **Saccarosio e zucchero invertito:** se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Questo medicinale contiene 5,55 g di saccarosio per dose (15 ml). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.
- **Sodio:** questo medicinale contiene 27,9 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per dose (15 ml). Questo equivale a 1,40% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.
- **Etanolo:** questo medicinale contiene 5,256 vol % di etanolo (alcol) che corrispondono a circa 597 mg per 15 ml di farmaco. La quantità in 15 ml di farmaco è equivalente a meno di 12 ml di birra o 5 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.
- **Glicole propilenico:** questo medicinale contiene 1650 mg di glicole propilenico per dose che equivale a 1650 mg ogni 15 ml. Se lei è in gravidanza o sta allattando, non prenda questo medicinale se non diversamente raccomandato dal medico. Il medico potrà fare ulteriori controlli durante la terapia. Se lei soffre di malattie al fegato o ai reni, non prenda questo medicinale se non diversamente raccomandato dal medico. Il medico potrà fare ulteriori controlli durante la terapia.
- **Sodio Benzoato:** questo medicinale contiene 15 mg di sodio benzoato per dose (15 ml).

### **3. Come prendere Vicks Tosse Fluidificante**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

*Adulti e adolescenti oltre i 12 anni*

La dose raccomandata è di 15 ml

*Bambini dai 6 agli 11 anni*

La dose raccomandata è di 10 ml

*Bambini dai 2 ai 5 anni*

La dose raccomandata è di 5 ml

Queste dosi possono essere ripetute ogni 4 ore, fino a 6 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

Usi il bicchiere dosatore graduato in dotazione alla confezione.

Se dopo un breve periodo di trattamento non si ottengono risultati apprezzabili, consultare il medico.

### **Se prende più Vicks Tosse Fluidificante di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale o di un uso scorretto del farmaco si rivolga al medico o al più vicino ospedale.

Se prende una dose eccessiva di Vicks Tosse Fluidificante, potrebbero manifestarsi sintomi come confusione mentale, vertigini e disturbi allo stomaco e all'intestino.

Se assume accidentalmente una dose particolarmente alta di Vicks Tosse Fluidificante, potrebbero manifestarsi eccitazione, confusione mentale, depressione della funzionalità respiratoria, nausea e vomito.

L'utilizzo di elevate dosi di medicinale per lunghi periodi potrebbe favorire l'insorgenza di calcoli (renali o urinari).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- fastidio addominale, nausea, vomito, diarrea, edema (gonfiore) delle labbra o della lingua;
- reazioni di ipersensibilità con prurito, arrossamenti ed eritema della pelle.

Se manifesta uno di questi effetti indesiderati interrompa l'assunzione del medicinale e consulti immediatamente un medico:

- Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- forte prurito con eruzione cutanea o gonfiore della pelle;
- edema (gonfiore) del viso;
- broncospasmo, difficoltà di respirazione (dispnea), edema (gonfiore) della gola;
- capogiri, mal di testa.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare Vicks Tosse Fluidificante**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene Vicks Tosse Fluidificante**

- Il principio attivo è la guaifenesina. 1 ml di prodotto contiene 13,33 mg (1,333% p/v) di guaifenesina.
- Gli altri componenti sono: saccarosio, saccarina sodica, glicole propilenico, etanolo 96 per cento, sodio citrato, acido citrico anidro, carmellosa sodica, ossido di polietilene, aroma miele/zenzero, aroma verbena, levomentolo, macrogol stearato, sodio benzoato, acqua depurata.

#### **Descrizione dell'aspetto di Vicks Tosse Fluidificante e contenuto della confezione**

Sciroppo in flaconi di vetro opaco da 120 ml e 180 ml con chiusura a prova di bambino ed un bicchiere dosatore graduato in polipropilene.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Procter & Gamble S.r.l. - Viale Giorgio Ribotta 11 - 00144 Roma

*Produttore*

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter-&Gamble Strasse 1, 64521 Gross-Gerau, Germania.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato ad Aprile 2026**