

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Gaviscon Bruciore e Indigestione compresse masticabili gusto menta

Sodio alginato/Sodio bicarbonato/Calcio carbonato

250 mg/106,5 mg/187,5 mg

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- **Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.**

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
3. Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE E A COSA SERVE

Gaviscon Bruciore e Indigestione è una combinazione di due antiacidi (calcio carbonato e sodio bicarbonato) e di un alginato che agisce in due modi.

1. Formando una barriera protettiva sul contenuto dello stomaco per lenire il bruciore nel suo torace fino a 4 ore.
2. Neutralizzando l'eccesso di acido nello stomaco per alleviare il dolore e il fastidio.

Questo medicinale è indicato per il trattamento dei sintomi del reflusso gastro-esofageo correlati all'acidità, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco ed indigestione, ad esempio dopo i pasti o durante la gravidanza.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Non prenda Gaviscon Bruciore e Indigestione

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e Precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Gaviscon Bruciore e Indigestione se:

- soffre o ha sofferto di **malattie significative ai reni o al cuore**, in quanto alcuni sali possono interferire con queste malattie (si rivolga al medico riguardo il contenuto di sali)
- se il medico le ha detto che ha un'intolleranza a qualche zucchero
- ha **gravi problemi renali**
- ha disturbi elettrolitici che causano **bassi livelli di fosfato** nel sangue (ipofosfatemia).
- se sa di avere una **quantità ridotta di acido gastrico** nello stomaco, in quanto questo medicinale potrebbe essere meno efficace.

Così come per altri prodotti antiacido, l'assunzione di Gaviscon Bruciore e Indigestione sospensione orale gusto menta in bustine può mascherare i sintomi di altre malattie pre-esistenti più gravi.

- contiene solfiti: raramente possono causare gravi reazioni allergiche (ipersensibilità) e respiro sibilante o difficoltà respiratorie (broncospasmo)

Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, consulti il medico.

Bambini

Non dia questo medicinale a bambini al di sotto dei 12 anni di età senza il consiglio del medico.

Vi è il rischio che aumentino i livelli di sodio nel sangue (ipernatriemia) nei bambini che hanno problemi renali o che hanno un'infezione dello stomaco o dell'intestino (gastroenterite).

Altri medicinali e Gaviscon Bruciore e Indigestione

Non prenda questo medicinale entro due ore dall'assunzione di altri medicinali per via orale perché può interferire con l'azione di alcuni altri medicinali.

Specialmente se lei sta assumendo antistaminici, antibiotici (tetracicline e chinoloni come norfloxacina), sali di ferro, ormoni tiroidei, antifungini come ketoconazolo, digossina e beta-bloccanti (medicinali utilizzati per patologie cardiache), neurolettici (medicinali utilizzati per i disturbi della mente), tiroxina, cloroquina (medicinale utilizzato per curare la malaria), bifosfonati (medicinali utilizzati per curare alcune malattie delle ossa), ed estramustina (medicinale utilizzato contro il cancro alla prostata).

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Può prendere questo medicinale se è incinta o se sta allattando al seno o se sta pianificando una gravidanza. Come per tutti i medicinali, la durata del trattamento deve essere limitata il più possibile.

Informazioni importanti su alcuni componenti di Gaviscon Bruciore e Indigestione

Ogni compressa masticabile contiene 5,86 mg di aspartame (E951).

L'aspartame è una fonte di fenilalanina e può esserle dannosa per pazienti affetti da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.

Le compresse contengono carmoisina (E122) che può causare una reazione allergica.

Questo medicinale contiene 223,7 mg (9,728 mmoli) di sodio per 4 compresse. La dose massima giornaliera raccomandata di questo medicinale contiene 895 mg di sodio (componente principale del sale da cucina). Questo equivale al 44,75% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto. Chieda al suo medico o al farmacista se ha bisogno di Gaviscon Bruciore e Indigestione giornalmente per un lungo periodo, soprattutto se segue una dieta a basso contenuto di sodio.

Inoltre, questo medicinale contiene 300 mg (7,5 mmol) di calcio per 4 compresse. Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale se ha calcoli renali o alti livelli di calcio nel sangue.

Se il medico le ha detto che ha un'intolleranza a qualche zucchero, contatti il medico prima di prendere questo medicinale.

3. COME PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti e bambini da 12 anni in su: quando i sintomi si presentano prenda da 2 a 4 compresse dopo i pasti e la sera prima di andare a letto, fino a quattro volte al giorno.

Per somministrazione orale, le compresse devono essere masticate prima di ingerirle.

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve è improbabile che questo le provochi danno. Tuttavia si può sentire gonfio. Consulti il suo medico se questo sintomo non passa.

Se dimentica di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Se dimentica una dose non è necessario raddoppiare la dose la volta successiva, continui a prenderlo come prima.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verificano questi effetti indesiderati smetta di prendere questo medicinale e consulti immediatamente un medico.

Molto raramente (meno di 1 paziente su 10.000) c'è la possibilità di una reazione allergica ai componenti del medicinale che possono manifestarsi con gonfiore del viso, labbra, lingua o gola, e difficoltà respiratorie (reazione anafilattica, reazione anafilattoide) o eruzione cutanea pruriginosa (orticaria). Altri sintomi possono includere dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, prurito della pelle, prurito o eruzione cutanea e respiro affannoso (broncospasmo).

L'ingestione di grandi quantità di calcio carbonato, un componente di questo medicinale, può causare un aumento del pH del sangue (alcalosi), troppo calcio nel sangue (ipercalcemia), che può portare la sindrome da latte-alcali, un'aumentata secrezione di acido nello stomaco (effetto molto raro), e costipazione. Questi sintomi si verificano normalmente a seguito di assunzione di dosi superiori rispetto alla dose raccomandata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

5. COME CONSERVARE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'astuccio dopo Scad. (mese/anno). La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**Cosa contiene Gaviscon Bruciore e Indigestione**

- I principi attivi per ogni compressa sono 250 mg di sodio alginato, 106,5 mg di sodio bicarbonato e 187,5 mg di calcio carbonato.
- Gli altri componenti sono xilitolo (contiene carmellosa sodica), magnesio stearato, macrogol, mannitolo (E421), copovidone, acesulfame-K, aspartame (E951), aroma menta (contiene maltodestrina e gomma arabica) e carmoisina (E122). Il prodotto non contiene glutine.

Descrizione dell'aspetto di Gaviscon Bruciore e Indigestione e contenuto della confezione

Compresse piatte, rotonde, a doppio strato con bordi smussati e con odore e sapore di menta. Uno strato della compressa è di colore rosa leggermente screziato, l'altro strato è bianco.

Gaviscon Bruciore e Indigestione è disponibile in confezioni contenenti 16, 24, 48 e 60 compresse masticabili.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.

Via G. Spadolini, 7

20141 Milano

Produttore

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, Schiphol 1118BH, Paesi Bassi

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Paesi Bassi: Gaviscon Duo muntsmaak, kauwtabletten

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

26 Aprile 2024